

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 18.6.2001 Aggiornamento: 27.9.2001	PROCEDURA N. 70 NORME PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE
Destinatari	Personale operante in reparti o servizi ove si rendano necessari interventi di disinfestazione.

◀ TRATTAMENTO CON FENDONA 60 SC

Il prodotto utilizzato è a base di composto di piretro.

◀ INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il prodotto è tossico per ingestione. Dalla scheda di sicurezza risulta che il prodotto può essere irritante per la cute e le vie respiratorie. Non è irritante per gli occhi. In caso di manifestazioni da ipersensibilità contattare il Pronto Soccorso.

◀ MODALITA' DI IMPIEGO

L'insetticida, specifico per insetti volanti e striscianti, viene spruzzato, sotto forma di liquido, su pavimenti e superfici. Durante questa operazione negli ambienti deve essere presente solo il personale della Società esterna incaricata.

Il personale ospedaliero dovrà farsi carico, prima dell'operazione, di rimuovere dall'ambiente cibi e bevande e riparare adeguatamente stoviglie e strumenti di impiego medico - sanitario eventualmente presenti. Qualora il trattamento dovesse essere effettuato in laboratori o comunque in zone di lavoro sanitario il personale ospedaliero dovrà curare la rimozione del materiale a rischio biologico o radiologico che possa costituire fonte di rischio per gli operatori addetti alla disinfestazione. In particolare, se possibile, dovrà chiudere e asportare i contenitori in cartone per ROT. Il Preposto del Reparto/Servizio è responsabile della verifica dell'attuazione di queste disposizioni e, a verifica effettuata, autorizzerà gli operatori della Società esterna ad iniziare il trattamento.

Per un trattamento efficace, dopo l'irrorazione, gli ambienti devono essere mantenuti chiusi per circa un'ora e le successive pulizie dovranno essere effettuate dopo 24 ore circa dal trattamento stesso.

◀ MODALITA' DI RIENTRO NEGLI AMBIENTI

Qualora rientrando negli ambienti si noti presenza di umidità su pareti, pavimenti o piani di lavoro occorre lasciar asciugare il prodotto, senza rimuoverlo. L'ambiente va ventilato aprendo le finestre (quando possibile).

Qualora sia indispensabile rientrare in un ambiente prima che sia trascorsa almeno un'ora dal trattamento occorre:

1. non aprire le finestre
2. indossare una maschera facciale per vapori FFP3 SL, disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione o il magazzino;
3. indossare guanti monouso;
4. permanere nell'ambiente solo per il tempo strettamente necessario alla mansione da compiere;
5. all'uscita dall'ambiente, lavarsi il viso e le porzioni di cute scoperte.